



LIÈVRE D'EUROPE

Lepus europaeus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
53 cm	*** 3,8 kg	8 ans	41 jours	2 par portée

Le lièvre est originaire des steppes herbeuses et affectionne les espaces dégagés faits de prairies et de plaines céréalières. À la fin de l'hiver et au printemps, les lièvres « boxent » et parfois s'arrachent des poils du poitrail lors de la période du bouquinage.



RENARD ROUX

Vulpes vulpes

TAILLE

90 cm

POIDS



7 kg

LONGÉVITÉ

3 ans

GESTATION/
INCUBATION

52 jours

NOMBRE
DE PETITS

5 par portée

Appelé « Goupil » jusqu'au Moyen-Âge, le renard est un omnivore opportuniste. Il utilise la technique de chasse du « mulotage » qui consiste à sauter à pieds joints et à retomber pattes en avant sur sa proie (généralement un rongeur). Souvent maudit comme pilleur de poulailler, le renard roux est connu pour être un animal très intelligent, d'où l'expression bien connue : « Rusé comme le renard ».





CHEVREUIL

Capreolus capreolus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
105 cm	 **** 20 kg	15 ans	150 jours	2 par portée

Excellent coureur et sauteur, le chevreuil peut bondir à près de 2m de haut et jusqu'à 6 m en longueur. Sa vitesse de pointe peut atteindre 70 km/h. Le mâle porte des bois caducs plutôt courts. S'il consomme de manière excessive des bourgeons au début du printemps, le chevreuil peut être observé avec un comportement inhabituel, comme ivre.





FAISAN DE COLCHIDE

Phasianus colchicus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
90 cm	*** 1 kg	8 ans	25 jours	10 par portée

Originnaire de Chine, le faisan de Colchide a été introduit il y a quelques siècles pour la chasse et vit maintenant à l'état naturel dans les plaines agricoles. Proche de notre poule domestique, il a cependant une queue bien plus longue. Le mâle est très coloré tandis que la femelle est plus terne, dans les tons beiges à bruns. Son camouflage lui permet de couvrir au sol à l'abri du regard des prédateurs.



BRUANT PROYER

Emberiza calandra

TAILLE

18 cm

POIDS

*
55 gr

LONGÉVITÉ

10 ans

GESTATION/
INCUBATION

13 jours

NOMBRE
DE PETITS

4 par portée

Espèce dite « parapluie », là où le bruant proyer est encore présent, il témoigne du maintien de bonnes conditions de l'environnement pour l'accueil de la vie sauvage. Granivore l'hiver à la recherche de céréales, il est insectivore pendant la reproduction. Il chante au printemps sur toutes sortes de perchoirs allant d'une simple tige végétale au piquet de clôture ou les fils électriques et peut chanter pendant une heure sans bouger.





BRUANT JAUNE

Emberiza citrinella

TAILLE

17 cm

POIDS

✱
27 gr

LONGÉVITÉ

12 ans

GESTATION/
INCUBATION

13 jours

NOMBRE
DE PETITS

4 par portée

Jaune vif en période nuptiale, le bruant jaune chante perché au sommet d'un buisson ou d'une haie et est généralement silencieux une fois sur le sol. Saviez-vous que les quatre premières notes de la Cinquième Symphonie de Beethoven reproduisent le chant du bruant jaune ?





BERGERONNETTE PRINTANIÈRE

Motacilla flava

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
16 cm	* 23 gr	8 ans	13 jours	6 par portée

Absente de nos contrées en hiver, dès son retour, la bergeronnette printanière joue un rôle primordial dans la destruction des insectes ravageurs des cultures. Cet oiseau était autrefois appelé « petite bergère », pour son attrait des prairies humides et sa présence au sein des troupeaux.





BERGERONNETTE GRISE

Motacilla alba

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
19 cm	* 25 gr	10 ans	13 jours	6 par portée

Bergeronnette la plus courante. Au sol, c'est un oiseau qui marche très rapidement en hochant la queue. Aussi appelée « hochequeue » ou « lavandière », la bergeronnette grise se laisse approcher avant de s'envoler d'un vol ondulant pour aller se poser quelques mètres plus loin. Elle recherche des surfaces à végétation rase ou absente (fumiers, talus, champs nus, prairies pâturées, ...).





CORNEILLE NOIRE

Corvus corone

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
50 cm	*** 550 gr	20 ans	19 jours	4 par portée

Omnivore opportuniste souvent confondue avec le corbeau, la corneille noire a le bec noir, le crâne plat, la queue carrée et la robe noir mat. Au sol, cet oiseau sautille. La corneille craille. Extrêmement intelligente, la corneille chasse à partir de postes d'observations (arbres isolés) et survole la campagne à faible hauteur à la recherche de ses proies.



CHOUCAS DES TOURS

Coloeus monedula

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
39 cm	* 245 gr	14 ans	18 jours	5 par portée

Le choucas des tours est un oiseau qui affectionne les lieux en hauteurs (falaises, clochers, cheminées, ...). Parfois confondu avec le corbeau ou la corneille, le choucas est un petit corvidé aux yeux bleus.



FAUCON CRÉCERELLE

Falco tinnunculus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
38 cm	* 225 gr	16 ans	28 jours	5 par portée

Petit mais costaud, le faucon crécerelle est un rapace diurne qui chasse où la végétation est rase pour repérer facilement ses proies. Caractérisé par son vol sur place appelé vol « du Saint Esprit », le faucon crécerelle est comme suspendu par un fil où il bat des ailes rapidement. Soudain il plonge, ailes repliées le long du corps, puis il déploie ses ailes, saisit sa proie entre ses serres et se réfugie dans un endroit tranquille pour la manger.





BUSARD DES ROSEAUX

Circus aeruginosus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
54 cm	*** 650 gr	17 ans	33 jours	5 par portée

Nichant habituellement dans de vastes roselières, le busard des roseaux a désormais bien du mal à trouver cet habitat humide devenu si rare en Wallonie. On le retrouve de plus en plus dans les champs de céréales qui lui donnent un site de nidification de substitution.



 TENDANCE



BUSARD SAINT-MARTIN

Circus cyaneus

TAILLE

50 cm


POIDS

550 gr

LONGÉVITÉ

17 ans

GESTATION/
INCUBATION

30 jours

NOMBRE
DE PETITS

5 par portée

Svelte avec de longues ailes digitées un peu coudées et une longue queue droite, le Busard St Martin se nourrit principalement de rongeurs. Il peut nicher dans les cultures de céréales ou dans les boqueteaux. Volant à faible hauteur audessus du sol, il est extrêmement agile ce qui lui permet de fondre sur ses proies en un battement d'aile.



faune & biotopes



BUSE VARIABLE

Buteo buteo

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
55 cm	** 975 gr	25 ans	35 jours	5 par portée

Rapace diurne le plus commun en Wallonie, la buse variable chasse à l'affût d'un poste, des proies au sol, en se laissant tomber sur elles après un vol plané. En vol, elle se caractérise par de larges ailes arrondies à leurs extrémités, et par une queue en «éventail». Elle porte le nom de variable car ses variétés de couleurs peuvent aller du blanc immaculé au noir charbon en passant par tous les intermédiaires possibles.



BUSARD CENDRÉ

Circus pygargus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
50 cm	✱ 450 gr	16 ans	32 jours	4 par portée

Appréciant les prairies steppiques, le busard cendré a profité de l'ouverture des paysages pour s'installer en plaine agricole. Si ce nouvel habitat lui apparaît favorable par les ressources en rongeurs qu'il y trouve et les champs de céréales qui lui offrent un site propice de nidification, c'est sans connaître le fait que ses petits ne savent bien souvent pas encore voler quand la moissonneuse passe pour effectuer la récolte des grains.





LAPIN DE GARENNE

Oryctolagus cuniculus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
37 cm	*** 1,7 kg	7 ans	30 jours	7 par portée

Le lapin est une espèce de lisière, qui ne vit pas en plein champ. À l'état sauvage, il mange de l'herbe ou autres plantes diverses et vit dans un terrier aussi appelé garenne. Il est caecotrophe c'est-à-dire qu'il ré-ingère ses crottes régulièrement.





CORBEAU FREUX

Corvus frugilegus

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
45 cm	* 475 gr	20 ans	17 jours	4 par portée

Granivore à omnivore souvent confondu avec sa cousine la corneille, le corbeau freux a le bec de couleur claire voire blanchâtre et sans plume. Son plumage a des reflets bleuâtres, violacés et métalliques, la queue est pointue. Au sol, cet oiseau marche. Le corbeau croasse. Il niche en colonie dans la cime des grands arbres.



PIE BAVARDE

Pica pica

TAILLE

50 cm

POIDS

*
220 gr

LONGÉVITÉ

15 ans

GESTATION/
INCUBATION

21 jours

NOMBRE
DE PETITS

9 par portée

La pie bavarde est très compétitive envers d'autres oiseaux et peut établir des stratégies pour faire fuir les plus récalcitrants. Elle est capable de se reconnaître dans un miroir et a une excellente mémoire.





BLAIREAU EUROPÉEN

Meles meles

TAILLE	POIDS	LONGÉVITÉ	GESTATION/ INCUBATION	NOMBRE DE PETITS
70 cm	***** 12 kg	5 ans	60 jours	5 par portée

Animal massif à courtes pattes terminées par de puissantes griffes, le blaireau est un bâtisseur qui se creuse un terrier 3 étoiles et qui peut atteindre plus de 300 m de galeries, aménagées avec différentes pièces, dont une « crèche » pour accueillir les petits blaireautins qui sont aveugles les premières semaines de leur vie. Le terrier est réutilisé de générations en générations et il arrive au blaireau de le partager avec d'autres mammifères (lapin, renard).

